

DOI: <https://doi.org/10.17816/dv80084>

Фотогалерея. Саркоидоз (часть 2)

Е.С. Снарская, Н.П. Теплюк

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Саркоидоз (син.: болезнь Бенье–Бека–Шауманна, доброкачественный гранулематоз, хронический эпителиоидно-клеточный ретикулоэндотелиоз) — мультисистемное заболевание из группы гранулематозов неизвестной этиологии, морфологической особенностью которого является развитие эпителиоидно-клеточных гранулём без казеозного некроза с процессами дистрофии, деструкции и фиброзирования в тканях различных органов. С учётом разнообразия клинических поражений выделяют три основные формы — внегрудную, внутригрудную, смешанную (генерализованную).

Мы публикуем вторую часть нашей фотогалереи.

Ключевые слова: гранулематоз; саркоидоз кожи; типичные и атипичные варианты.

Для цитирования:

Снарская Е.С., Теплюк Н.П. Фотогалерея. Саркоидоз (часть 2) // *Российский журнал кожных и венерических болезней*. 2021. Т. 24, № 3. С. 319–324.
DOI: <https://doi.org/10.17816/dv80084>

Рукопись получена: 20.04.2021

Рукопись одобрена: 20.04.2021

Опубликована: 10.10.2021

Photogallery. Sarcoidosis (part 2)

Elena S. Snarskaya, Natalia P. Teplyuk

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation

ABSTRACT

Sarcoidosis (synonym: Benier–Beck–Schaumann disease, benign granulomatosis, chronic epithelioid cell reticuldo-endotheliosis) — is a multisystem disease from the group of granulomatosis, of unknown etiology, the morphological feature of which is the development of epithelioid cell granulomas without caseous necrosis fibrosis in the tissues of various organs. Taking into account the variety of clinical lesions, there are three main forms: extrathoracic, intrathoracic, mixed (generalized).

We are publishing the second part of our photo gallery.

Keywords: granulomatosis; skin sarcoidosis; typical and atypical variants.

For citation:

Snarskaya ES, Teplyuk NP. Photogallery. Sarcoidosis (part 2). *Russian Journal of Skin and Venereal Diseases*. 2021;24(3):319–324.
DOI: <https://doi.org/10.17816/dv80084>

Received: 20.04.2021

Accepted: 20.04.2021

Published: 10.10.2021



Рис. 17. Больная З., 65 лет. Атипичный вариант саркоидоза: аннулярный саркоид Бека. Диаскопия: феномен «пылинок» положительный.

Fig. 17. Patient Z., 65 years old. Atypical variant of sarcoidosis: Beck's annular sarcoid. Diascopy: the phenomenon of "dust particles" is positive.



Рис. 18. Пациентка Т., 67 лет. Крупноузелковый саркоид Бека ушной раковины, единственный узел.

Fig. 18. Patient T., 67 years old. Large-nodular Beck's sarcoid of the auricle, single node.



Рис 19. Больная Н., 45 лет. Мелкоузелковый саркоид, возникший через 11 лет на месте татуажа. При обследовании выявлен саркоидоз внутригрудных лимфоузлов.

Fig. 19. Patient N., 45 years old. Small-knot sarcoidosis that arose 11 years later at the site of tattooing. Swarm examination revealed sarcoidosis of the intrathoracic lymph nodes.



Рис. 20. Больная А., 37 лет. Крупноузелковый саркоид Бека, возникший на коже бровей и в надбровной области сразу после татуажа и покраски бровей.

Fig. 20. Patient A., 37 years old. Beck's large nodular sarcoid, which arose immediately after tattooing and dyeing the eyebrows both on the skin of the eyebrows and in the superciliary region.



Рис. 21. Больная И., 48 лет: а — сочетание типичного мелкоузелкового и атипичного варианта аннулярного саркоида Бека; б — фрагмент кожи руки: типичный узел при саркоидозе с множественными телеангиэктазиями на поверхности.

Fig. 21. Patient I., 48 years old: а — combination of typical small-nodular and atypical variants of Beck's annular sarcoid; б — fragment of the hand skin: a typical sarcoidosis node with multiple surface telangiectasias.



Рис. 22. Больной Ф., 28 лет: *а* — мелкоузелковый саркоид, возникший после систематического курения кальяна; *б* — поражение красной каймы нижней губы и слизистой оболочки.

Fig. 22. Patient F., 28 years old: *a* — small-knot sarcoidosis, which has arisen after systematic hookah smoking; *b* — lesion of the red border of the lower lip and mucous membrane.




Рис. 23. Больной П., 18 лет: *а* — крупноузелковый саркоид Бека; *б* — высыпания на лице.

Fig. 23. Patient P., 18 years old: *a* — Beck's large nodular sarcoid; *b* — rash on the face.



Рис. 24. Больная П., 45 лет. Диффузно-инфильтративный саркоидоз кожи.

Fig. 24. Patient P., 45 years old. Diffuse-infiltrative skin sarcoidosis.



Рис. 25. Больной Б., 53 года. Крупноузелковый саркоид Бека.

Fig. 25. Patient B., 53 years old. Beck's large nodular sarcoid.




Рис. 26. Больная Р., 49 лет: *а* — мелкоузелковый саркоид Бека; *б* — фрагмент кожи туловища более крупным планом; *в* — феномен «пылинок», телеангиэктазии при дерматоскопии.

Fig. 26. Patient R., 49 years old: *a* — Beck's small-nodular sarcoid; *b* — close-up photo of the trunk skin fragment; *c* — the phenomenon of «dust particles», telangiectasia during dermatoscopy.




Рис. 27. Больной Ж., 53 года. Мелкоузелковый саркоид Бека.

Fig. 27. Patient J., 53 years old. Beck's small-nodular sarcoid.



Рис. 28. Больная М., 45 лет. Атипичный вариант саркоидоза: аннулярный саркоид Бека.

Fig. 28. Patient M., 45 years old. Atypical variant of sarcoidosis: Beck's annular sarcoid.



Рис. 29. Больная О., 45 лет. Ангиолюпоид Брока–Потрие.

Fig. 29. Patient O., 45 years old. Angioliupoid Broca–Potrie.



Рис. 30. Больная Л., 18 лет: *а* — озноблённая волчанка Бенье–Теннессона; *б* — фрагмент кожи лица более крупным планом; *в* — крупный узел на указательном пальце кисти.

Fig. 30. Patient L., 18 years old: *a* — feverish lupus erythematosus Benier–Tennesson; *б* — close-up photo of the facial skin fragment; *в* — large knot on the index finger of the hand



Рис. 31. Больная Д., 58 лет. Крупноузелковый саркоид Бека.

Fig. 31. Patient D., 58 years old. Beck's large nodular sarcoid.



Рис. 32. Больная Г., 46 лет: *а* — крупноузелковый саркоид Бека; *б* — высыпания на коже лба.

Fig. 32. Patient G., 46 years old: *a* — Beck's large nodular sarcoid; *b* — eruptions on the skin of the forehead.



Рис. 33. Больная П., 50 лет: *а* — крупноузелковый саркоид Бека; *б* — фрагмент кожи спины более крупным планом.

Fig. 33. Patient P., 50 years old: *a* — Beck's large nodular sarcoid; *b* — a fragment of the skin of the back in a closer view.



Рис. 34. Больная М., 46 лет. Мелкоузелковый саркоид Бека.

Fig. 34. Patient M., 46 years old. Beck's small-nodular sarcoid.